

KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA CZYNNOŚCI SPRZĄTAJĄCYCH PO WIZYCIE:

1. Umyj i zdezynfekuj ręce, a następnie załóż fartuch jednorazowy, ochronę na obuwiu, maseczkę chirurgiczną oraz rękawiczki
2. Wyrzuć wszystkie użyte podczas badania materiały medyczne jednorazowe (rękawiczki, maska, jednorazowy fartuch i czepek) do pojemnika na odpady zakaźne
3. Użyte do zabiegów ostre odpady (igły, ostrza do skalpela) wyrzuć do pojemnika z twardymi ściankami (biohazard), a następnie umieść go zabezpieczonego przed otwarciem w koszu z medycznymi odpadami zakaźnymi.
4. Odsuń od ścian i okien wszystkie ruchome elementy
5. Wyczyść i zdezynfekuj powierzchnie przy użyciu jednorazowych ściereczek*
6. W przypadku podajników ZZ wyjmij ręczniki jednorazowe z dozowników i umieść je w czerwonym worku
7. Umyj i zdezynfekuj*:
 - powierzchnie pionowe: ściany zmywalne (mopem), kinkiety, okna, parapety, drzwi i kaloryfery
 - wyposażenie gabinetu: unit, asystor, biurko, krzesła, szafki, drukarkę, lampy stojące, telefon, klawiaturę i myszkę komputera oraz powierzchnie trudnodostępne (kółka, zawiasy itp.)
 - kącik sanitarny: glazurę, umywalkę, baterie umywalkowe dozowniki
 - pojemnik na odpady
 - podłogę na obrzeżach pomieszczenia – podłogę umyć namoczoną mopem, techniką polegającą na prowadzeniu mopa bez odrywania go od posadzki, w kierunku do siebie metodą ósemkową

KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU SPRZĄTANIA:

1. Zdejmij ubranie ochronne, maseczkę i rękawiczki a następnie umieść je w czerwonym worku na odpady medyczne i zdezynfekuj ręce
2. Umyj i zdezynfekuj pozostałą część podłogi, w kierunku do wyjścia
3. Zużyte mopy umieść w osobnym białym worku opisanym pranie skażone, a następnie przekaż do pralni
4. Umyj i zdezynfekuj również przedmioty, które zostały użyte w celu sprzątnięcia pomieszczenia
5. Wszystkie odpady z gabinetu oraz strój ochronny włóż w dwa czerwone worki, oklej kodem odpadów oraz danymi wytwórcy odpadów oraz umieść widoczny dopisek „MATERIAŁ WYSOKOZAKAŻNY DLA LUDZI”. **Odpady te powinny być przekazane w ciągu 24 godzin do Firmy odbierającej odpady**
6. Zdezynfekuj drogę dojścia pacjenta do pomieszczenia i jego wyjścia z przychodni (poręcze schodów, klamki, lady itd.)

* należy użyć preparatu o działaniu bakteriobójczym, drożdżakobójczym, prątkobójczym, wirusobójczym wobec poliovirusa, adenowirusa i norowirusa w czasie działania 30 sek – 60 sek – 5 min- 15 minut